Cirsium arvense, Acker-Kratzdistel

Asteraceae, Korbblütler

Ökologie:

Cirsium arvense wächst auf Äckern, Schuttplätzen, an Wegen und Ufern auf frischen, im Untergrund feuchten, nährstoff- und stickstoffreichen Lehmböden. Die Art kommt von der Ebene bis 1350 m vor. *Cirsium arvense* ist eine nordisch-eurasiatisch-submediterrane Art.

Merkmale:

Cirsium arvense ist eine ausdauernde, sich auch über Ausläufer vermehrende und bis zu 120 cm hoch werdende Art. Die Blütenköpfe bestehen ausschließlich aus blass-purpurnen Röhrenblüten und sind meist in einem doligen-rispigen Blütenstand zusammengesetzt. Nicht selten sind die einzelnen Blütenköpfe zu mehreren am Ende der Stängel „zusammengeknäult“. Die Blütezeit reicht von Juli bis September. Die Blätter sind mehr oder weniger tief gesägt, selten auch fiederspaltig und dornig bewimpert. Die Blattoberseite ist dunkelgrün und kahl, während die Unterseite grünlich bis grau filzig ist. Die Stängelblätter sind nie stängelumfassend. Der ästige Stängel ist fast komplett kahl und nur im oberen Teil etwas wollig. Auch ist der Stängel ungeflügelt und stachellos.