

Cirsium vulgare, Gewöhnliche Kratzdistel

Asteraceae, Korbblütler



Ökologie:

Cirsium vulgare wächst in Unkrautgesellschaften, an Wegen, Schuttplätzen, Waldschlägen sowie in Lichtungen auf feuchten und nährstoffreichen Lehmböden. Die Art kommt von der Ebene bis 1350 m vor. *Cirsium vulgare* ist eine eurasiatisch-subozeanisch-submediterrane Art.

Merkmale:

Cirsium vulgare ist eine ein- bis zweijährige, bis zu 150 cm hohe und etwas verzweigte Art, die im ersten Jahr eine kräftige Rosette bildet und erst im folgenden Jahr blüht. Die Blütenköpfe bestehen aus purpurnen Röhrenblüten und stehen einzeln am Ende der Äste. Die Hülle der blühenden Köpfe ist bis 5 cm lang. Die Blütezeit reicht von Juni bis September. Die Blätter sind tief fiederspaltig. Die Blattzipfel sind 3-eckig, ungleich lang und lanzettlich. Oft stehen die 2 seitlichen Zipfel ab, so dass das Blatt eine „dreidimensionale“ Ausrichtung erhält. Die Spitze der Zipfel läuft in einen kräftigen, gelben Dorn aus. Die Blattoberseite ist dornhaarig und die Blattunterseite kraushaarig bis weißwollig. Der Stängel ist wollig behaart und dornig geflügelt.