


Leucanthemum vulgare agg., Gewöhnliche Margerite

Asteraceae, Korbblütler



Ökologie:

Leucanthemum vulgare agg. wächst in Wiesen, Rainen, Trockenrasen, Gebüsch und an Weg- sowie Straßenrändern auf frischen, nährstoffreichen sowie lehmigen Böden. Die Artengruppe kommt von der Ebene bis 2200 m vor. *Leucanthemum vulgare* agg. ist eine eurasiatisch-subozeanische Artengruppe.

Merkmale:

Das *Leucanthemum vulgare* agg. ist eine 5 Kleinarten umfassende Gruppe. Die Arten des *Leucanthemum vulgare* agg. sind ausdauernd und bis zu 100 cm hoch. Die Blütenköpfe bestehen aus randlichen, weißen Zungenblüten sowie inneren, gelben Röhrenblüten und stehen einzeln am Ende des Stängeln. Der Rand der Hüllblätter ist hellbraun. Die Blütezeit reicht von Mai bis September. Die Blätter sind spatelförmig bis lanzettlich, am Blattrand gezähnt oder fiederteilig und verschmälern sich plötzlich in den Blattstiel. Oft umfassen die untersten Blattzähne den Stängel etwas („Öhrchen“). Die obersten Blätter sind viel kleiner als die untersten. Der Stängel ist komplett kahl oder behaart und einfach oder verzweigt.