

## *Lysimachia vulgaris*, Gewöhnlicher Gilbweiderich

Primulaceae, Primelgewächse



### Ökologie:

*Lysimachia vulgaris* wächst in Hochstaudengesellschaften, Bruch- und Auwäldern, in Moorwiesen und an Gräben und Quellen auf nassen, basenreichen und humosen Ton-, Lehm- oder Torfböden. Die Art kommt von der Ebene bis 1800 m vor. *Lysimachia vulgaris* ist eine eurasiatische Art.

### Merkmale:

*Lysimachia vulgaris* ist eine Staude von 130 cm Wuchshöhe mit langen schnurartigen Ausläufern. Die Blüten stehen in end- und seitenständigen Trauben und bilden eine pyramidale Rispe. Die Krone ist gelb, am Rand kahl, innen drüsig behaart und fast bis zum Grund geteilt. Die Kelchzipfel sind rot berandet. Die Blütezeit reicht von Juni bis August. Die sehr kurz gestielten Blätter sind breit lanzettlich bis elliptisch, ganzrandig und locker rot punktiert. Unterseits sind die Blätter weichhaarig. Diese stehen gegenständig oder quirlständig in 3- bis 4-er Gruppen zusammen. Der Stängel ist oft verzweigt, kurz behaart und stumpf 5-kantig.