




***Myosotis scorpioides* agg., Sumpf-Vergissmeinnicht**  
**Boraginaceae, Raublattgewächse**



**Ökologie:**

*Myosotis scorpioides* agg. wächst in Sumpfwiesen, Röhrichtern, Bruchwäldern, an Gräben und Ufern auf nassen bis feuchten und nährstoffreichen Böden. Die Artengruppe kommt von der Ebene bis 1700 m vor. *Myosotis scorpioides* agg. ist eine eurasiatisch-subozeanisch-submediterrane Artengruppe.

**Merkmale:**

Das *Myosotis scorpioides* agg. umfasst ein Gruppe von ausdauernden und bis 50 cm hoch werdenden Arten. Auch bei diesen stehen die Blüten in unbeblätterten Wickeln zusammen. Der Kelch ist zu einem Drittel gespalten, anliegend behaart aber ohne Hakenhaare. Die Krone ist hellblau, manchmal rötlich. Die Blütezeit reicht von Mai bis Oktober. Die Blätter sind oval und behaart. Die Haare sind auf der Unterseite alle vorwärts gerichtet. Der Stängel ist stumpf kantig, oft rau und matt. Der Stängel wächst aufsteigend und wurzelt oft am Grund. Im unteren Teil ist der Stängel abstehen behaart, im oberen Teil anliegenden behaart und mit vorwärts gerichteten Haaren versehen.