

Prunella vulgaris, Kleine Braunelle

Lamiaceae, Lippenblütler



Ökologie:

Prunella vulgaris wächst in Wiesen, Weiden, Parkrasen, an Ufern und Waldwegen auf frischen, nährstoffreichen, lehmigen und tonigen Böden. Die Art kommt von der Ebene bis 2200 m vor. *Prunella vulgaris* ist eine nordisch-eurasiatische Art.

Merkmale:

Prunella vulgaris ist ausdauernd, breitet sich durch wurzelnde Ausläufer stark vegetativ aus und wird bis 30 cm hoch (Blütenstand). Die Blüten sind in Quirlen angeordnet, die wiederum endständig in „Köpfen“ bzw. „Ähren“ zusammen stehen. Das oberste Stängelblattpaar sitzt direkt unter dem Blütenstand. Die Krone ist purpur- bis blauviolett und hat eine gerade Röhre. Die Blütezeit reicht von Juni bis September (oft eine Nachblüte bis November). Die kurz gestielten Blätter sind länglich eiförmig, spitzzulaufend und ganzrandig bis etwas gezähnt. Der Stängel ist 4-kantig und niederliegend bis aufsteigend. Die ähnliche Art *Prunella grandiflora*, Große Braunelle, macht keine Ausläufer, ist insgesamt größer und das oberste Stängelblattpaar ist vom Blütenstand relativ weit entfernt. Ebenso hat diese Art eine nach oben gebogene Röhre.