

Senecio vulgaris, Gewöhnliches Greiskraut

Asteraceae, Korbblütler



Ökologie:

Senecio vulgaris wächst in Unkrautgesellschaften, Äckern, Gärten, Brachen, Waldschlägen, an Wegen und Schuttplätzen auf frischen, nährstoffreichen, humosen, lockeren und meist sandigen bis lehmigen Böden. Die Art kommt von der Ebene bis 1850 m vor. *Senecio vulgaris* ist eine mediterran-eurasiatische Art.

Merkmale:

Senecio vulgaris wächst i. d. R. einjährig und wird bis zu 40 cm hoch. Die Blütenköpfe stehen in unregelmäßigen Rispen zusammen, haben randlich nur sehr selten Zungenblüten und im Inneren gelbe Röhrenblüten. Die Hülle ist zylindrisch mit 8-10 Hüllblättern, die an der Spitze schwarz sind. Oft nicken die Blütenknospen. Die Blütezeit reicht von Januar bis Dezember (meist bis zum Frost). Die Blätter sind buchtig fiedertelig mit dreieckigen Abschnitten, die rechtwinklig abstehen. Diese sind kahl oder am Mittelnerv zottig behaart. Der Stängel ist stark ästig und z.T. spinnwebig behaart. Die ähnliche Art *S. sylvaticus* hat im Unterschied zu *S. vulgaris* eine Hülle mit bis zu 5 äußeren Hüllblättern ohne schwarze Spitzen. Auch ist diese Art in der Regel größer als *S. vulgaris*.