

Thymus pulegioides agg., Breitblättriger Thymian

Lamiaceae, Lippenblütler



Ökologie:

Thymus pulegioides agg. wächst in Magerrasen, Trocken- und Halbtrockenrasen, an Böschungen, Weg- und Waldrändern und auch auf Felsen auf warmen, trockenen, basenreichen aber kalkärmeren, sandigen Lehmböden. Die Artengruppe kommt von der Ebene bis 2250 m vor. *Thymus pulegioides* agg. ist eine eurasiatisch-subozeanische Artengruppe.

Merkmale:

Unter *Thymus pulegioides* agg. werden mehrere Unterarten gefasst. Generell ist die Gattung *Thymus* sehr artenreich (vgl. Fischer et al. 2008). Die Typusart des *Thymus pulegioides* agg. ist ein bis zu 25 cm hoch werdender, etwas kriechender, locker- bis dichtbuschiger Halbstrauch, der im Gegensatz zu anderen *Thymus*-Arten keine sterilen Ausläufer treibt. Die Blütenstände sind kugelig bis zylindrisch und stehen am Ende der Zweige. Die rosa bis purpurnen Kronblätter werden bis 6 mm lang. Die Blütezeit reicht von Mai bis Oktober. Die Blätter sind oval mit kaum sichtbaren Blattnerven. Meist sind die Blätter kahl, z.T. nur am Rand bewimpert. Der Stängelquerschnitt (wichtiges Bestimmungsmerkmal bei der Gattung *Thymus*) ist rechteckig und besonders unter dem Blütenstand scharf 4-kantig. Ebenfalls ist der Stängel nur an den Kanten dicht behaart und nicht auf den Flanken. Die gesamte Pflanze ist stark aromatisch und (soll) zitronig riechen. Der Geruch ist aber kein sicheres Bestimmungsmerkmal.