

## *Tragopogon pratensis* s. l., Wiesenbocksbart

Asteraceae, Korbblütler



### Ökologie:

*Tragopogon pratensis* s. l. wächst in Wiesen, Unkrautfluren, Rainen und an Wegrändern auf frischen, nährstoffreichen, tiefgründigen und sandigen bis lehmigen Böden. Die Art kommt von der Ebene bis 1700 m vor. *Tragopogon pratensis* s. l. ist eine eurasiatisch-submediterrane Art.

### Merkmale:

*Tragopogon pratensis* s. l. ist eine zweijährig bis ausdauernde Art. Die Blütenköpfe stehen einzeln am Ende der Stängel. Die Blüten bestehen nur aus gelben Zungenblüten, die ca. so lang wie die Hülle sind. Alle Hüllblätter sind gleichlang und stehen in 2 Reihen. Die Blütezeit reicht von Mai bis Juli. Die Blätter sind lanzettlich, lang zugespitzt und den Stängel halb umfassend. Der Hauptnerv der Blätter ist auf der Oberseite weiß, im Querschnitt innen hohl und bildet auf der Unterseite der Blätter einen stumpfen Kiel. Der Stängel ist aufrecht, unter dem Blütenstand nur wenig verdickt und wie die Äste und unteren Blätter weißfilzig. Am Wurzelhals befinden sich oft faserige Reste von alten Blättern.