

## *Pimpinella major*, Große Bibernelle

Apiaceae, Doldengewächse



### Ökologie:

*Pimpinella major* wächst in Wiesen (insbesondere im Gebirge), in Staudenfluren und an Viehlägern auf frischen, nährstoff- und basenreichen Lehm Böden. Die Art kommt von der Ebene bis 1900 m vor.. *Pimpinella major* ist eine subatlantische-präalpine Art.

### Merkmale:

*Pimpinella major* wird bis zu 90 cm hoch und ist meist vollständig kahl. Die weißen oder rosa Blüten stehen in bis zu 15-strahligen Dolden zusammen. Sowohl die Hüllen als auch die Hüllchen fehlen. Die Blütezeit ist von Juni bis September. Die Blätter sind einfach gefiedert und besitzen 1 bis 4 Fiederpaare. Die Teilblättchen sind bis zu 7 cm lang und länglich bis eiförmig im Umriss. Alle Blätter sind meist kahl und nur am Rand rau und oft stark glänzend, was diese Art von *P. saxifraga* unterscheidet. Die Blättchen sind, im Gegensatz zu der ähnlichen Art *P. saxifraga*, länger als breit und kurz bespitzt. Der Stängel ist scharfkantig und hohl. Die Wurzel riecht etwas nach Möhren.