

## *Cardamine amara*, Bitteres Schaumkraut

Brassicaceae, Kreuzblütler



### Ökologie:

*Cardamine amara* wächst in Quellfluren, an Gräben und Flüssen auf sickernassen, nährstoffreichen sowie meist kalkarmen Böden. Die Art kommt von der Ebene bis 1860 m vor. *Cardamine amara* ist eine eurasiatisch-submediterrane Art.

### Merkmale:

*Cardamine amara* wird bis zu 40 cm hoch und wächst ausdauernd, aufrecht bis aufsteigend und unverzweigt. Der Stängel ist kantig und meist kahl. Die Blüten sind weiß bis rötlich und besitzen dunkel-lila gefärbte Staubblätter. Die Früchte sind stabförmig, gerade und bis zu 40 mm lang. Die Blütezeit reicht von April bis Juni. Die Blätter sind gefiedert (bis zu 10 Fiederpaaren). Die Art bildet keine Grundblätter, aber zahlreiche Stängelblätter aus. Am Blattrand sowie am Mittelnerv sind die Blätter behaart. *Cardamine amara* darf nicht mit *Nasturtium officinale* verwechselt werden. Letztere Art bildet gefiederte Blätter mit großem und rundem Endabschnitt aus und hat zweireihig (anstatt einreihig) angeordnete Samen in der Schote. Auch sind bei *N. officinale* die Staubblätter gelb.