

Carex acutiformis, Sumpf-Segge

Cyperaceae, Sauergräser



Ökologie:

Carex acutiformis wächst in Großseggenriedern, Wiesen und Auwäldern auf überschwemmten bis nassen, nährstoffreichen und humosen Böden. Die Art kommt von der Ebene bis 1710 m vor.

Carex acutiformis ist eine eurasiatisch-subozeanisch-submediterrane Art.

Merkmale:

Carex acutiformis wird bis zu 120 cm hoch und bildet lange Ausläufer. Der Blütenstand ist bis zu 25 cm lang und besteht aus bis zu 6 (bis 6 cm langen und 8 mm dicken) sitzenden, aber aufrechten, weiblichen Ähren. Die 2-6 männlichen Ähren sind oberhalb der weiblichen. Die Art ist dreinarbig. Die Blütezeit reicht von Mai bis Juni. Das unterste Hochblatt überragt den Blütenstand weit. Der Stängel ist scharf 3-kantig und rau. Die Blätter sind bis zu 2 m lang, bis zu 10 mm breit und stark knickrandig mit rauer Oberseite. Diese Art ist sehr ähnlich zu *C. acuta*, die aber nur zweiarbig und angedeutet knickrandig ist und keine 3-kantige Spitze besitzt.