

Agrimonia eupatoria, Kleiner Odermennig

Rosaceae, Rosengewächse



Ökologie:

Agrimonia eupatoria wächst in Trockenrasengesellschaften, Säumen und entlang von Wegen auf warmen, kalkhaltigen und lehmigen Böden. Die Art kommt von der Ebene bis 900 m vor.

Agrimonia eupatoria ist eine eurasiatisch(-mediterrane) Art.

Merkmale:

Agrimonia eupatoria wächst ausdauernd und wird bis zu 100 cm hoch (Blütenstand). Die Blüten sind gelb. Die Fruchtschäfte sind verkehrt kegelförmig und über die ganze Länge gefurcht, deren äußere Hakenborsten rechtwinklig abstehen. Die Blütezeit reicht von Juni bis August. Die Blätter sind unterbrochen gefiedert und haben meist 5 bis 9 Blattpaare. Die Teilblätter sind oval und grob gesägt. Das Endblättchen ist meist kurz gestielt. Die Blattunterseite ist meist graufilzig. Der Blattgrund ist oft keilig. Die Art ähnelt *Potentilla anserina*. Diese besitzt aber glänzend silbrig-seidige Haare auf der Blattunterseite, auch sind die Blätter oberseits silbrig. Auch bildet diese Art Ausläufer. Die Art *Agrimonia procera* unterscheidet sich von *A. eupatoria* durch Drüsenhaare auf der Blattunterseite, durch eine nur teilweise gefurchte Fruchtschäfte sowie durch die teilweise rückwärts gerichtete Hakenborsten.