

Clinopodium vulgare, Wirbeldost

Lamiaceae, Lippenblütler



Ökologie:

Clinopodium vulgare wächst in lichten, trockenen Wäldern, Gebüschern und Wegrändern auf warmen, frischen, lockeren sowie kalkhaltigen Böden. Die Art kommt von der Ebene bis 1560 m vor. *Clinopodium vulgare* ist eine eurasiatisch-submediterrane Art.

Merkmale:

Clinopodium vulgare (= *Satureja vulgaris*) ist ausdauernd, wird bis zu 60 cm hoch und bildet mit dünnen Ausläufern größere Herden. Die Blüten stehen in 10- bis 20-blütigen, quirlig bzw. kopfförmig angeordneten Gruppen zusammen. Die Krone ist rosa und ca. 1,5 cm lang. Der Kelch ist röhrenförmig und 2-lippig. Die Blütezeit reicht von Juni bis September. Die kurz gestielten, eiförmigen und ganzrandigen bzw. gekerbten Blätter sind behaart, ebenso wie der Stängel. Die gesamte Pflanze ist geruchlos. Ähnlichkeit besteht zu der Gattung *Calamintha* und *Origanum*. Im Gegensatz zu *Calamintha* sind die Blätter von *Clinopodium* kaum drüsig punktiert und besitzen auf der Unterseite keine Drüsengrübchen (wie bei *Origanum*).