

Erodium cicutarium agg.,

Gewöhnlicher Reiherschnabel

Geraniaceae, Storchschnabelgewächse



Ökologie:

Erodium cicutarium agg. wächst in Ackerunkrautgesellschaften, an Wegrändern sowie auf Brachen auf trockenen, stickstoffhaltigen sowie meist kalkarmen, sandigen Böden. Die Art kommt von der Ebene bis ca. 500 m vor.. *Erodium cicutarium* agg. ist eine mediterran-urasiatische Art, die aber mittlerweile fast kosmopolitisch verbreitet ist.

Merkmale:

Erodium cicutarium agg. ist eine ein- oder zweijährig wachsende Art, die bis zu 40 cm hoch wird und niederliegend bis aufsteigend wächst. Die Blütenstände sind doldig und 2- bis 8-blütig. Die Kronblätter sind rosa. Die Frucht besitzt einen 3 bis 4 cm langen Schnabel. Unter dem Schnabel befindet sich eine Einschnürung. Die Blütezeit reicht von April bis Oktober. Die Blätter sind gefiedert, kurz behaart und oft auch drüsig. Die Teilblätter sind fast bis zum Mittelnerv geteilt. Im Gegensatz zu der ähnlichen Gattung *Geranium* sind die Schnäbel bei allen *Erodium*-Arten korkenzieherartig gedreht.