

## *Ononis spinosa* agg., Dorniger Hauhechel

Fabaceae, Schmetterlingsblütler



### Ökologie:

*Ononis spinosa* agg. wächst in Weiden und Trockenrasengesellschaften, an Wegrändern und in lichten Gebüschern auf nährstoffhaltigen Lehm- oder Kalkböden. Die Art kommt von der Ebene bis 940 m vor. *Ononis spinosa* agg. ist eine subatlantisch-submediterrane Art.

### Merkmale:

*Ononis spinosa* agg. ist ein bis zu 60 cm hoch werdender Halbstrauch, der keine Ausläufer bildet. Die Blüten sind rosa bis violett (z.T. auch bläulich oder weiß) und erscheinen in den Blattwinkeln der bedorneten Zweige. Das Schiffchen ist verlängert zu einem Schnabel. Die Blütezeit reicht von Juni bis September. Die Blätter sind 3-zählig und bestehen aus ovalen, gezähnten und bis zu 3 cm langen Teilblättchen. Der Stängel ist meist rötlich sowie 1- oder 2-reihig behaart.. Die Art *O. repens* aus dem Aggregat *O. spinosa* bildet Ausläufer und besitzt drüsenhaarige Stängel und Blätter sowie deutlich breit-ovale bis rundliche Teilblätter. Auch stehen die Blüten (bis zu 3) auf langen Stielen zusammen.