

## ***Ranunculus flammula* agg., Brennender-Hahnenfuß**

**Ranunculaceae, Hahnenfußgewächse**



### **Ökologie:**

*Ranunculus flammula* agg. wächst an Ufern, Sümpfen und Quellen auf nassen, sauren und nährstoffreichen Schlamm Böden. Die Art kommt von der Ebene bis 1900 m vor. *Ranunculus flammula* agg. ist eine eurasiatische Art.

### **Merkmale:**

*Ranunculus flammula* agg. ist eine Artengruppe mit zwei Arten (*R. flammula* s. str. und *R. reptans*) und bildet bis zu 75 cm lange Stängel. Die Blüten sind gelb mit einem Durchmesser von bis zu 1,5 cm. Der Schnabel an den Früchten ist sehr kurz und gerade. Die Blütezeit reicht von Juni bis Oktober. Die Blätter sind ganzrandig, lanzettlich bis länglich und sitzen an niederliegenden bis aufsteigenden Stängeln, die an den Knoten wurzeln. Besonders ist, dass die untersten Blätter lang gestielt sind. Die Stängelblätter sind fadenförmig und oft bogig gekrümmt. Die in Bayern seltene Art *R. reptans* hat im Vergleich zu *R. flammula* s. str. deutlich schmalere Blätter, kürzere Blattstiele und wurzelt auch an den Stängelknoten. Auch ist die Pflanze von *R. reptans* deutlich zarter.