

## *Vicia hirsuta*, Behaarte Wicke

Fabaceae, Schmetterlingsblütler



### Ökologie:

*Vicia hirsuta* wächst in Ackerunkrautgesellschaften, an Wegrändern, in Hecken und auf Schuttplätzen auf nährstoffreichen, sandig-lehmigen Böden. Die Art kommt von der Ebene bis 990 m vor. *Vicia hirsuta* ist eine eurasiatisch-submediterrane Art.

### Merkmale:

*Vicia hirsuta* ist eine einjährige, bis zu 60 cm hoch rankende oder niederliegend bis aufsteigende Art. Die Blüten sind weiß (z.T. bläulich überhaucht), bis zu 4 mm lang und stehen in Gruppen von bis zu 6 zusammen. Der Blütenstand besitzt einem grannenartigen Fortsatz am Ende. Die Blütezeit reicht von Juni bis September. Die Blätter sind paarig gefiedert und bestehen aus bis zu 10 Fiederpaaren mit verzweigter Endranke. Die Teilblätter sind gestutzt mit bis zu 3 kleinen Spitzen. Die Frucht ist flach, dicht und kurz behaart sowie meist 2-samig. Die ähnliche Art *V. tetrasperma* hat meist 4 Samen, gerundete bis teilweise etwas spitze (stets ungestutzte) Teilblätter, sowie pfeilförmige Nebenblätter. Diese sind bei *V. hirsuta* am Grund in mehrere, schmale Zipfel geteilt.